

ТИП SARCOMASTIGOPHORA**Ю.А. Загородняя****Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь****ТИП SARCOMASTIGOPHORA
ПОДТИП MASTIGOPHORA
КЛАСС PHYTOMASTIGOPHOREA
ОТРЯД DINOFLAGELLIDAE
ПОДОТРЯД DINIFERINA
СЕМЕЙСТВО NOCTILUCIDAE**

1. *Noctiluca scintillans* Kofoid & Svezy, 1921 (Sur.) (= *N. miliaris*). Отмечен М.А.Долгопольской (1940), К.В. Ключаревым (1951), Г.-В. Муриной, Ю.А.Загородней (1989) Т.В. Павловской и др (2003). Массовый вид в голопланктоне Карадагского заповедника в 1980 — 1990 гг. и по настоящее время. Максимальная биомасса наблюдается весной. В 1999 г. она составляла почти 200 мг/м³ в слое 0 — 10 м. Летом появляется в бухтах обычно при сгонных явлениях.

Литература

- Долгопольская М.А.* Зоопланктон Черного моря в районе Карадага // Труды Карадагської біологічної станції. — 1940. — Вип.6. — С.57 — 111.
- Ключарев К.В.* Материалы для количественной характеристики зоопланктона Черного моря у Карадага // Труды Карадагской биологической станции. — 1952. — Вып. 12. — С. 78 — 95.
- Мурина Г.-В., Загородняя Ю.А.* Зоопланктон // Природа Карадага. — Киев: Наукова думка, 1989. — С. 228 — 233.
- Павловская Т.В., Загородняя Ю.А., Морякова В.К.* Зоопланктоны прибрежной акватории Карадагского природного заповедника в 2001 г. // Карадагский природный заповедник. Летопись природы. Т. XVIII, 2001 г. — Симферополь: СОНАТ. — 2003. — С. 111 — 118.