

**ТИП НЕМЕРТИНЫ****Н.С. Костенко****Карадагский природный заповедник НАН Украины, Феодосия****КЛАСС****ПОДКЛАСС ANOPLA M. SCHULTZE, 1851****ОТРЯД HETERONEMECTINI BIIRGER, 1982****СЕМЕЙСТВО LINEIDAE MCINTOSH, 1874****ПОДСЕМЕЙСТВО LINEINAE BIIRGER, 1904**

1. *Lineus Locteus (Rathke, 1843)*. Приводится в списке Л.А. Прокудиной (1952).
2. *Lineus ruber O.F. Müller, 1771*. Приводится в списке Л.А. Прокудиной (1952).
3. *Nemertini q. sp.* Многочислен. В 70-е годы И.А. Синегуб (2004) отмечал в обрастаниях верхней сублиторали плотность 4 экз./м<sup>2</sup> по данным М.И. Киселева и др. (1984) — 20 экз./м<sup>2</sup>. Встречается на рыхлых грунтах у пляжа Биостанции, в Восточной Пуццолановой бухте, Львиной бухте, гроте Шайтана, южной Сердоликовой бухте и бухте Коктебель.

**Литература**

- Киселева М.И., Валовая Н.А., Новоселов С.Ю. Видовой состав и количественное развитие бентоса в биотипе песка района Карадагского заповедника // Экология моря. — 1984. — Вып. 17. — С. 70 — 75.
- Мюллер Г. Тип Немертины // Определитель фауны Черного и Азовского морей. — Киев: Наукова думка. — 1968. — Т.1. — С. 84 — 110.
- Прокудина Л.А. Каталог фауны и флоры Черного моря района Карадагской биологической станции // Труды Карадагской биологической станции. — 1952. — Вып. 12. — С. 116 — 127.
- Синегуб И.А. Макрофауна зоны верхней сублиторали скал в Черном море у Карадага // Карадаг. Гидробиологические исследования. Сборник трудов, посвященный 90-летию Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского и 25-летию Карадагского природного заповедника НАН Украины. — Симферополь: СОНАТ. — 2004. — С. 118 — 129.